

三才圖會

三才圖會

雲間允明父王思義續集

身體六卷

發背瘡圖

發腦瘡圖

發髻瘡圖

發髭瘡圖

紫疥瘡圖

火赤瘡圖

紅絲瘡圖

魚脊瘡圖

腎疽瘡圖

冷疔瘡圖

血疔瘡圖

風疔瘡圖

鵝陷瘡圖

疔腫瘡圖

青疔瘡圖

赤疔瘡圖

白疔瘡圖

黑疔瘡圖

黃疔瘡圖

冷疔瘡圖

陰蝕瘡圖

漏睛瘡圖

臙瘡圖

癰癰瘡圖

耳疳瘡圖

骨槽風圖

便毒瘡圖

喉閉瘡圖

鎖喉瘡圖

發乳瘡圖

火殞瘡圖

纏腸瘡圖


牙疳瘡圖

水流麻根瘡圖

赤癰瘡圖

疥癬瘡圖

發背瘡圖



夫發背者風熱邪毒灌於肋骨之間發在經絡之內憂苦
滯樂營衛俱虛有痰真氣衰殘毒茲攻發治法煎當歸連
翹散下解毒丸疏通然後服乳香黃耆散托其背瘡口上
蟾酥丸量瘡大小四邊腫處貼乳香拔毒散如瘡潰上追
毒烏金散去其惡肉桃花散收斂

發腦瘡圖



夫發腦者伏陽結滯邪毒上壅或生玉枕之端或在風池
形如硬癰漸次潰爛遍生痛如刀刺赤腫無膿凡發腦與
發背同法治之

發 髻 瘡 圖



夫發髻者風邪積毒手陽明經客於會合之前灌在關後
形如米粒漸次赤腫遍身熱瘡尖有膿血沉困頭眩生吐
逆治法先服當歸連翹散下解毒丸先疏利後服消風散
去其風熱瘡口上用追毒散貼之

發髭瘡圖



夫發髭者脾胃虛熱心肺邪風上攻禾膠之端多在承漿
之側形如羊刺四邊腫硬痛難禁黃水流時麻痺增寒生
吐逆治法先服當歸連翹散瘡口微擦破上貼針頭散神
應膏如腫熱大調乳香拔毒散貼之疼者用乳香黃耆散

紫 疥 瘡 圖



夫紫疥者腹中毒氣經絡相傳發於定脉之關瘡生形如
紫疥或疼或痒遍生不拘何處頂黑陷心傳至腹中嘔逆
治紫疥法與疔相同

火 赤 瘡 圖




夫火赤瘡者氣血虛殘邪毒攻發初生赤色瘡漿走徹以
膿胞黃水流時沾破皮膚如火燎治法先煎消毒散去渣
冷用鷄毛掃在瘡上後服當歸連翹散或服乳香黃耆散
亦可

紅絲瘡圖



夫紅絲者心腸積毒氣血相凝灌於經絡之間發在肌膚之上紅絲貫穿或疼或痒血箭行時暈到心間人必死治法先用針當暈刺之及瘡首微刺破出血上貼針頭散用當歸連翹散下一解毒丸疎其風熱調和榮衛

魚脊瘡圖



夫魚脊者臟中精冷虛熱得傳經絡筋骨之內發動不知
何處初如疽癰破時黃水流生白骨似魚脊治法先服當
歸連翹散乳香黃耆散瘡上貼針頭散追毒烏金散量瘡
用藥

骨 疽 瘡 圖



夫骨疽者血凝氣滯徹骨酸疼風毒邪熱侵入榮衛痒悶
自然腫痛難禁日久成膿宜用針破治法溫經活血如不
愈者酒服黃耆丸乳香黃耆散如成膿用針刺破撚入蟾
酥丸追毒散潰時量瘡用藥

冷 痺 瘡 圖



夫冷痺者臟腑虛寒腠理毒惡損傷榮衛外邊臙破時膿
水泡如痺日久將深入骨髓損傷人必死治法當服消風散
解毒之藥此四症相類治法各別

血 疳 瘡 圖



夫血痺者臟中虛弱邪氣相侵發於肌膚形似紫疥破時
出血遍身行處成瘡血暈損傷皮肉一般相似治法先服
當歸連翹散祛風久且和血瘡上搽乳香輕粉散

風 痺 瘡 圖



夫風痺者經連脾胃絡足陽明客於谷道之端注於承山
之側初生癰疥破時黃小浸成瘡風濕相傳毒惡所攻生
遍體治法先服黃耆丸搽如聖膏

鵝腦瘡圖



夫鴉喙者胎中受症血氣虛邪腠理相侵發於皮膚之上
初生如錢竅後爛似鴉喙日久將深臟腑損傷無可治之
術此症小兒先服解毒丸如麻大用鴉喙散麝香輕粉散
搽之

疔 腫 瘡 圖




夫疔腫者血凝氣滯風熱相搏發於經絡之間注在毛竅之內如粟粒或痛或痒遍身麻木頭眩寒熱時生吐逆神昏恍惚治法先服當歸連翹散下解毒丸疎其內後酒服乳香黃耆散去其毒肉桃花散收斂之

青 疔 瘡 圖



夫青疔者肝臟毒氣膽腑邪風灌於經絡之間發於肋骨之內離火盛舌強語澁神昏坎水虛寒熱煩燥治法同前瘡服藥貼之

赤 疔 瘡 圖



夫赤疔者心火邪熱必發驚狂先疏通其內後治其外

白 疔 瘡 圖



白疔者大腸虛熱肺腑邪風外乘皮肉之間發於毛竅之內初生白色燎漿走徹膿泡咳唾稠粘鼻口乾咽喉燥熱凡此症屬肺腑受病先服乳香黃耆散外用針頭散或蟾酥丸疼用追毒烏金散

黑 疔 瘡 圖



夫黑疔者膀胱虛熱腎臟邪風外攻兩耳之端發在毛竅之內初生黑色麻木硬似石磚恍惚心驚沉困神昏貪睡治法亦與前瘡同服當歸連翹散外貼透骨膏

黃 疔 瘡 圖



夫黃疔者脾中受熱胃氣邪風起於唇齒之端發在人中
之側初生黃色四邊麻木如痺手足難擡煩燥心驚嘔逆
治法與前症同以透骨膏貼之

冷 疥 瘡 圖



夫冷疔者膏梁之變風濕餘毒太陰久冷攻放膝下初生如米漸成潰爛色如煤敗血來浸骨肉損壞成大患經年骨節疼累歲不生肌治法先服黃耆丸乳香黃耆散瘡口上用鐵粉散追毒丸去惡肉用桃花散收斂之如疼煎洗毒散洗之

陰蝕瘡圖



夫陰蝕者臟中虛怯腎氣衰殘風邪入腑毒惡損傷榮衛
或時痛痒漸成竅作疳膿水流須用神方速効

漏睛瘡圖



夫漏睛者肝臟毒氣小腸邪風外攻腎端灌於瞳人初生
痒疼漸成膿水色如疳日久睛昏氣敗肝絕無方救之治
法先服黃耆消風黃連地骨皮煎湯洗貼追毒散收飲

膳 瘡 圖



失膳瘡者腎臟虛寒邪毒併攻三里之傍陰交之側下焦
久損漸次潰爛難癒風濕相合骨肉損傷治法先用洗毒
散洗淨瘡口搽麝香輕粉散神應膏貼之服當歸黃耆丸

療癰瘡圖



夫瘰癧者風膿實血四証相侵風瘰者熱盛餘毒膿瘰者
虛寒在肺實瘰者脾胃虛熱感邪風血瘰者血氣攻心多
赤色風膿實血五臟各分別治法四症皆同如瘡不破當
開破上用如聖餅子神應膏貼之又服瘡藥

耳 疳 瘡 圖



夫耳痒者風邪入腦腎臟虛寒上攻兩耳之中浸漬肌膚
之上連年不効作成膿水撲人腥與肺相通腐爛蝕肌生
穢氣治法用麝香輕粉吹入耳內

骨 槽 風 圖



夫骨槽風者太陽受症結於大腸之間邪毒交侵灌於經絡之內牙根作痛聚成敗血似刀刺風熱相凝堵塞咽喉連腮腫凡治風腫牙疼骨槽風服乳香草撥散及當歸連翹散

便癰瘡圖



夫便癰者膀胱虛熱腎臟邪風壅結氣海之間發在丹田
之側離火盛伏鬱氣結於膏肓坎水虛殘邪熱攻乎肌體
治法先服當歸連翹散或通聖散腫處用乳香拔毒散貼
如不散發膿者針破膿出膏藥貼之

喉閉瘡圖



夫喉閉者風熱血氣相凝發舌本之間注於重樓之上全身不遂榮衛有傷百脉相通一萬三千五百數治法先服涼藥洗心疏利上隔次用吹喉散治之

鎖喉瘡圖




夫鎖喉者心經毒氣小腸邪風發於聽會之端注於懸膺之側初生如瘰癧漸次腫破結癰毒氣相凝閉塞咽喉治法先服當歸連翹散瘡上貼乳香收毒散如成膿以針刺破上以蟾酥丸追毒散膏藥貼之

發乳瘡圖



夫發乳者內攻毒氣外感風邪滲於肌肉之間發在乳房之側漸成核聚不散結爲癰疽榮衛相凝臟腑損傷生此腫痛治法先服當歸連翹散次服黃耆散瘡口上貼追毒散神應膏

火 殞 瘡 圖



夫火殞者心經毒熱大感邪風發於血脈之間注在肌膚
之上初生赤色漸成腫破串皮紅火氣相連陽盛陰衰生
此症治法先服當歸連翹散又煎消毒散洗之

圖 瘡 腸 纏



夫纏腸者腸內血凝氣滯迴迴運度不能相逆聚結成癰
因生腫毒治法先服當歸連翹散下解毒九次服乳香黃
耆散如不散者膿成日透方用針深刺膿出瘡口方用膏
藥貼之如無顯跡內有成膿者但服乳香黃耆散自然膿
出於大小便也

牙 疳 瘡 圖



夫牙疳者脾中邪熱胃氣餘毒上攻唇齒之端注在牙根之側或時腫痛化爲腐成疳蝕敗血束侵潰爛牙槽生穢氣治法先服當歸連翹散疳蝕處貼青金膏

水 沕 麻 根 瘡 圖



夫水流脉根者膀胱陰怯心火餘毒發在血脉之間病生不拘何處肉爛皮傷腫痛治法先服當歸連翹散下解毒凡痛者乳香黃耆散瘡口上貼追毒散

赤癰瘡圖



夫赤癰者風邪毒氣榮衛浮行相犯經絡之間發在肌膚
或因藥勢感風熱在其臟腑餘毒血脉貫串生赤腫治法
先服解毒丸煎消毒散掃之

疥癬瘡圖



夫疥癬者心火熾熱腎水虛寒傳於皮肉之間發則肌膚
燥痒抓成瘡疥生於遍體治法服升麻和氣飲搽藥如聖
散